

## Tabla de Decisiones de Vacunación

Debería vacunar:		
Durante el período de espera	<b>Sí</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La vacunación de todos los animales cuando entran el refugio es una pauta para niveles aceptables en todo el mundo y es la mejor manera para proteger la salud de los animales.</li> <li>• Juntas estatales de medicina veterinaria y consejero legal puede ser consultado cuando hay preocupaciones de propiedad.</li> </ul>
Cuando el animal tiene una herida	<b>Sí</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si existiera alguna herida en la mascota, la vacuna no afectaría su recuperación.</li> <li>• No hay evidencias que indiquen que la vacuna no funcione si hay heridas en la mascota.</li> <li>• La vacunación no debe tener prioridad sobre la estabilización médica de pacientes con heridas graves.</li> </ul>
Con una enfermedad menor	<b>Sí</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No es probable que la vacunación de estos animales impacte el curso de una enfermedad actual.</li> <li>• Es posible que la vacuna funcione y los proteja de enfermedades infecciosas.</li> </ul>
Con fiebre	<b>Sí</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La vacunación puede aun ser efectiva y proteger a las mascotas de enfermedades infecciosas cuando tienen poca fiebre (hasta 103.5F).</li> </ul>
Cuando uno en la camada es más pequeño o más grande de los otros	<b>Sí</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si hay algún miembro de la camada que tiene edad de 4 semanas por lo menos, todos en la camada deberían ser vacunados no importa el tamaño.</li> </ul>
Animales lactantes o cuando está lactando	<b>Sí</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La vacunación protegería la madre de enfermedades infecciosas graves y no es probable que sea dañino a la camada.</li> <li>• Los cachorros o gatitos lactantes no estarán protegidos cuando la madre se está vacunando. La camada se debe empezar a vacunar a las 4 semanas.</li> </ul>
Cuando está preñada	<b>Sí</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La vacunación protegerá la madre preñada de enfermedades infecciosas graves y puede proteger la cría durante las primeras semanas de vida.</li> <li>• Hay un riesgo pequeño a los cachorros y gatitos cuyas madres fueron vacunadas durante la gestación, pero los beneficios superan los riesgos en los refugios.</li> <li>• Si el animal no se vacuna, el animal debe ser mantenido en un lugar protegido afuera del refugio para minimizar contacto con las enfermedades infecciosas.</li> </ul>
Cuando tiene edad menos que 4 semanas	<b>No</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Los animales que tienen edad menos de 4 semanas deberían ser mantenidos en un hogar de adopción o un área separada de la población general.</li> <li>• Es posible que las vacunas con virus vivos modificados resulten en anomalías de desarrollo en estos animales.</li> </ul>