

Recomendaciones de Vacunación para los Perros en Refugios

Vacuna	Perros Adultos (>20 semanas de edad)	Cachorros (4-20 semanas de edad)	Donde Administrar	Notas
Virus recombinante o vivos modificados de moquillo, hepatitis vírica, y parvovirus canino (DA ₂ P)	<p>Dar una dosis durante o antes de la admisión.</p> <p>Dar la segunda dosis 2-3 semanas después.</p>	<p>Dale una dosis durante o antes de la admisión.</p> <p>Dale dosis adicionales cada 2-3 semanas hasta 20 semanas de edad.</p>	Subcutáneo, pierna anterior derecha	Repetir en un año y luego cada 3 años.
Bordetella bronchiseptica Intranasal y Canine Parainfluenza Virus	<p>Dar una dosis durante o antes de la admisión.</p>	<p>Dar una dosis durante o antes de la admisión.</p> <p>Debe ser administrado a 3 semanas de edad por lo menos.</p>	Intranasal	<p>Repetir vacunación intranasal cada año.</p> <p>Algunos productos intranasales contienen Canine Adenovirus-2.</p> <p>Productos intranasales son vacunas vivas y no se pueden administrar de otra manera; complicaciones graves pueden ocurrir.</p> <p>Productos orales e inyectables no son recomendados.</p>
La Rabia	<p>Dar una dosis durante la admisión o antes de la salida.</p>	<p>Dar una dosis en la edad legal (>12 semanas) durante la admisión o antes de la salida.</p>	Subcutáneo, pierna posterior derecha	Administración de la vacuna contra la rabia es dirigido por las leyes del estado o comunidades locales.